

張蓓蓓

日期：2015年9月2日 星期三 18時30分01秒 CST
寄件人：輔大公告信 <sysop@mail.fju.edu.tw>
主旨：輔大公告信：認識登革熱問與答篇
收件人：張蓓蓓 <014647@mail.fju.edu.tw>

主旨：

認識登革熱問與答篇

發文單位：學務處衛生保健組
業務承辦人：張蓓蓓
連絡分機：2527
回信電子郵件地址：014647@mail.fju.edu.tw

認識登革熱問與答篇
～輔大衛保組關心您～

Q：什麼是登革熱？

A：登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀；登革熱依抗原性可分為I、II、III、IV型等四種型別。

Q：登革熱的感染方式為何？

A：感染方式主要是藉由病媒蚊叮咬人時將病毒傳入人體內，並不會由人直接傳染給人，也不會經由空氣或接觸傳染。

Q：台灣傳播登革熱的病媒蚊有哪些種類？

A：台灣地區傳播登革熱的病媒蚊為斑蚊屬，特徵是身體黑色，腳上有白斑，主要是埃及斑蚊和白線斑蚊兩種。其中埃及斑蚊成蚊胸部兩側具有一對似七弦琴之縱線及中間一對黃色縱線，喜棲息於室內；白線斑蚊中胸楯板有一條白色中央縱紋，多棲息於室外。

Q：登革熱的潛伏期有多久？

A：一般人感染病毒經3-8天的潛伏期後開始發病，但少數人的潛伏期可達14天。

Q：登革熱的傳染途徑？

A：登革熱病患於發病前一天至發病後第五天，血液中存在有登革熱病毒（此時期稱為病毒血症期），此時若被斑蚊叮咬，斑蚊因此感染病毒，而病毒在蚊蟲體內增殖8-12天後，病毒就會至病媒蚊的唾液腺，這隻斑蚊即具有傳染力，當它再叮咬其他健康人時，就將病毒傳出，這隻斑蚊終生均具有傳播病毒的能力。

Q：民眾經醫師診斷為登革熱應注意的事項？

- A：1. 遵照醫師指示服藥、休息、多喝水。
2. 自您發病後五日內，應注意避免被蚊蟲叮咬，而將病毒藉由蚊蟲散播出去。
3. 建議防蚊措施：
(1) 家中裝設紗窗紗門
(2) 穿著淺色長袖衣褲
(3) 睡覺時掛蚊帳
(4) 使用捕蚊燈或電蚊拍（蚊香僅具驅蚊效果）
(5) 必要時塗抹防蚊藥劑
(6) 生病期間儘量在家休息

Q：民眾經醫師診斷為登革熱應配合的事項

- A：1. 衛生局(所)將以您的住家為中心，對鄰近住戶實施訪視（疫情調查），訪查其他住戶是否有與您同樣症狀的人。如果您的親友出現類似症狀，應請他們儘速前往醫療院所就醫。
2. 衛生局(所)將以您的住家為中心，對鄰近住戶進行孳生源檢查，請家戶及社區配合清除各種積水容器。必須使用之貯水容器，不用時倒置，使用時加蓋密封，至少每週換洗一次，並刷洗內壁以清除蟲卵。
3. 若民眾住家或戶外有病媒蚊孳生源，經政府通知或公告應清除而不清除，經查核發現時，可依傳染病防治法第70條規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

Q：登革熱的死亡率？

- A：1. 典型登革熱：致死率低於1%。
2. 登革出血熱：若無適當治療，致死率可能超過20%，但若早期診斷並加以適當治療，死亡率可低於1%。

Q：感染登革熱好了以後，會再次得到登革熱嗎？

A：感染某一型登革熱病毒患者，對該型病毒具有終身免疫，而對其他型別僅具有短暫的免疫力，通常約為2-9個月之間，之後還有